

COVID-Impfstoffe

	Impfstoff	Zulassung ab	Lagerung	Haltbarkeit ungeöffnet 2-8°C	Sonstige Haltbarkeiten	Dosen pro Vial	Anzahl Impfdosen/ Abstand	Booster ab	2. Booster ab	STIKO - Hinweise
mRNA-Impfstoffe	Comirnaty® 30 µg Biontech/Pfizer Konzentrat für Injektionsdispers.	12 Jahre	9 Monate -75°C ± 15°C 14 Tage (-20°C ± 5°C)	31 Tage ungeöffnet max. 12h Transport	ungeöffnet 2h (max. 30°C) rekonstituiert 6h (2°C bis 30°C)	6 Dosen je Impfdosis: 0,3ml	2 Dosen / 3 Wochen STIKO: 3-6 Wochen	12 Jahre ab 6 Monate nach 2. Impfung STIKO: 3-6 Monate nach 2. Impfung	nicht zugelassen STIKO: ≥70 Jahre bzw. bes. Indikation ab 3 bzw. 6 Monate nach 1. Booster	ungeimpfte Schwangere ab 2. Trime- non je 2 Dosen mRNA Impfstoff im Abstand von 3-6 Wochen
	Comirnaty® 30 µg Biontech/Pfizer Injektionsdispersion	12 Jahre	9 Monate -75°C ± 15°C	10 Wochen ungeöffnet / inkl. Transport	ungeöffnet 12h (8° C bis 30°C) geöffnet 12h (2°C bis 30°C)	6 Dosen je Impfdosis: 0,3ml	2 Dosen / 3 Wochen STIKO: 3-6 Wochen	12 Jahre ab 6 Monate nach 2. Impfung STIKO: 3-6 Monate nach 2. Impfung	nicht zugelassen STIKO: ≥70 Jahre bzw. bes. Indikation ab 3 bzw. 6 Monate nach 1. Booster	ungeimpfte Schwangere ab 2. Trime- non je 2 Dosen mRNA Impfstoff im Abstand von 3-6 Wochen
	Comirnaty® 10 µg Biontech/Pfizer Konzentrat für Injektionsdispers.	5-11 Jahre	9 Monate -75°C ± 15°C	10 Wochen ungeöffnet / inkl. Transport	ungeöffnet 12h (max. 30°C) rekonstituiert 12h (2°C bis 30°C)	10 Dosen je Impfdosis: 0,2ml	2 Dosen / 3 Wochen STIKO: 3-6 Wochen	nicht zugelassen STIKO: siehe Hinweise	nicht zugelassen STIKO: siehe Hin- weise	Booster ab 5 Jahre mit Vorerkrankun- gen ab 6 Monate oder Immundefizienz ab 3 Monate nach 2. Impfung 2. Booster ab 5 Jahre mit Immundefi- zienz ab 3 Monate nach 2. Impfung
adjuvantierter Proteinimpfstoff	Spikevax® Moderna Injektionsdispersion	6 Jahre (STIKO-Empfeh- lung ab 30 J.)	9 Monate -25°C bis -15°C	30 Tage ungeöffnet max. 12h Transport	ungeöffnet 24h (8°C bis 25°C) geöffnet 19h (bei 2°C bis 25°C in- nerhalb der o.g. 24h)	10 Dosen je Impfdosis: 0,5ml 20 Dosen je Impfdosis: 0,25ml	2 Dosen / 4 Wochen ab 12 Jahre je 0,5 ml 6-11 Jahre je 0,25 ml STIKO: 4-6 Wochen	18 Jahre (Dosis= 0,25ml) ab 3 Monate nach 2. Impfung STIKO: siehe Hinweise	nicht zugelassen STIKO: ≥70 Jahre bzw. bes. Indikation ab 3 bzw. 6 Monate nach 1. Booster	Booster ab 30 Jahre (Dosis = 0,25ml) ab 3 Monate nach der 2. Impfung 2. Booster ab 30 Jahre bei Immundefi- zienz (Dosis = 0,5ml) keine Empfehlung für Schwangere, unabhängig vom Alter
	Nuvaxovid® Novavax CZ a.s. Injektionsdispersion	18 Jahre	9 Monate 2°C bis 8 °C	9 Monate ungeöffnet	geöffnet 6h (2°C bis 25°C)	10 Dosen je Impfdosis: 0,5ml	2 Dosen / 3 Wochen STIKO: min. 3 Wochen	nicht zugelassen	nicht zugelassen	bei Schwangeren/ Stillenden nicht empfohlen; in Einzelfällen bei produkt- spezifischer, medizinischer Kontra- indikation für mRNA-Impfstoffe zu erwägen
Vektorimpfstoff	Vaxzevria® AstraZeneca Injektionssuspension	18 Jahre (STIKO-Empfeh- lung ab 60 J.)	6 Monate 2°C bis 8 °C	6 Monate ungeöffnet	geöffnet 6h (max. 30°C) oder 48 h (2°C bis 8°C)	10 Dosen je Impfdosis: 0,5ml	2 Dosen / 4-12 Wochen STIKO: siehe Hinweise	nicht zugelassen STIKO: siehe Hinweise	nicht zugelassen STIKO: mit mRNA- Impfstoff (siehe 2. Booster mRNA-Impf- stoffe)	Heterologes Impfschema für Zweit- impfung mit mRNA Impfstoff nach 4 Wochen Booster mit mRNA-Impfstoff ab 3 Monate nach 2. Impfung
	COVID-19 Vaccine Janssen® Johnson & Johnson Injektionssuspension	18 Jahre (STIKO-Empfeh- lung ab 60 J.)	2 Jahre -25°C bis -15°C	11 Monate ungeöffnet	geöffnet einmalig 3h (max. 30°C) oder 6h (2°C bis 8°C)	5 Dosen je Impfdosis: 0,5ml	1 Dosis STIKO: siehe Hinweise	18 Jahre 2. Dosis ab 2 Monate nach 2. Impfung STIKO: siehe Hinweise	nicht zugelassen STIKO: mit mRNA- Impfstoff (siehe 2. Booster mRNA-Impf- stoffe)	Heterologes Impfschema für Zweitimp- fung mit mRNA Impfstoff oder Nuvaxo- vid ab 4 Wochen nach 1. Impfung Booster mit mRNA-Impfstoff ab 3 Monate nach 2. Impfung

Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand dieser Information: 03/2022